



## Algorithme / induction de coumadine chez l'adulte de 18 à 70 ans

Procédure conçue et agréée par le réseau GRANTED, pour son usage spécifique

Date de diffusion : mars 2010  
Version : 0.1  
Pages : 1

Rédigé par J. Yver  
Vérifié par : G. Pernod  
Modifié le :  
Destinataires : médecins

### 1 Objet

- Mise en route d'un traitement anticoagulant par **coumadine** chez l'adulte de 18 à 70 ans.
- L'utilisation exclusive de la coumadine **2 mg** est conseillée en début de traitement pour éviter toute confusion entre les 2 dosages.

### 2 Algorithme

#### Schéma d'initiation de la Coumadine chez les patients âgés de moins de 70 ans.

**INR cible 2,5**

**J1 : 1er jour de traitement AVK  
Coumadine comprimés dosés 2 mg**

Jour	Dose mg avant INR	INR matin (entre... et ...)	Saut de prise (jour)	Dose mg après INR	Intervalle entre 2 INR (Nbre jours)
J1	0	1 - 1,40	0	5 mg	2
J4	5 mg	1 - 1,30	0	8 mg	3
J4	5 mg	1,30 - 1,60	0	7 mg	3
J4	5 mg	1,60 - 1,90	0	6 mg	3
J4	5 mg	1,90 - 2,20	0	5 mg	3
J4	5 mg	2,20 - 2,60	0	4 mg	3
J4	5 mg	2,60 - 3	0	3 mg	3
J4	5 mg	3 - 3,60	0	2 mg	3
J4	5 mg	3,60 - 4,40	1	1 mg	3
J4	5 mg	> 4,40	2	0	1

Adapté de Crowther 1999